

麻しん・風しん定期予防接種

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を 受けましょう!

監修：国立成育医療センター 総長 加藤 達夫 先生

◇1歳になったら、早めに



◇就学前にも忘れずに

●ワクチンの接種にあたっては、医師と十分に相談してください。

医療機関名

※麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)は、
第1期：生後12～24カ月
第2期：5～7歳未満で小学校就学前の1年間に
それぞれ1回ずつ接種を行います。

麻疹(はしか)ってどんな病気?

麻疹に感染した人の「せき」や「くしゃみ」などで麻疹ウイルスが飛び散り、それを吸い込むことにより感染する病気です。

麻疹ウイルスは非常に感染力が強いため感染しやすいので、ワクチンによってあらかじめ免疫*を作り、予防することが、対策上もっとも重要です。

* 免疫:細菌やウイルスなどの異物が体内に侵入したときに、抗体を作ったり、リンパ球を増やすことで、その異物を排除しようとする働き。

主な症状

- 発熱(38°C前後の熱が2~4日
続き一時的に解熱した後、再び39~40°Cの高熱が出ます)
- 倦怠感
- せき
- 鼻水
- めやに
- 発疹
- など

気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などの重い合併症を併発する場合もあり、現在でも年間に数十例の死亡例が報告されています。



風しん(三日はしか)ってどんな病気?



風しんに感染した人の「せき」や「くしゃみ」などで風しんウイルスが飛び散り、それを吸い込むことにより感染する病気です。

感染力は麻疹ウイルスよりも弱く、症状がはっきりしない場合もあります。

しかし、大人がかかると重症になることが多く、とくに妊娠初期の妊婦が風しんにかかると、赤ちゃんが先天性風しん症候群*という病気を持って生まれる危険性があるため、子供のうちに免疫をつけておく必要があります。

*先天性風しん症候群: 免疫のない女性が妊娠初期に風しんに感染すると、風しんウイルスが胎児の発育に影響し、先天性心疾患、難聴、白内障、網膜症などの障害をもった赤ちゃんが生まれる可能性があります。これらの障害を先天性風しん症候群といいます。

主な症状

- 発熱(患者の約半数には、発熱はみられません)
- 発疹
- 耳の後ろや首などのリンパ節の腫れ

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を受ける時期は？

第1期と第2期に1回ずつ、計2回接種します。

■第1期:生後12～24カ月

■第2期:5～7歳未満で小学校就学前の1年間(通常、幼稚園・保育園児の最年長児がこれにあたります)



予防接種に関しては、お住まいの市町村の健康課などワクチン接種担当課、あるいはかかりつけの医師にご相談ください。

麻しんや風しんは乳幼児の早期にかかることが多いため、
1歳になったら、出来るだけ早めに予防接種を受けましょう！

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を

受ける前に注意すること

- ワクチンやお子様の体調について気になる点がある場合は、医師へ相談しましょう。
- 接種当日は、お子様の体調をよく観察し、健康状態が良いことを確認しましょう。
- 接種前日は入浴(またはシャワー)をして、体を清潔にしておきましょう。
- 予診票は正確に記入してください。
- 母子手帳があれば、持参してください。
- ガンマグロブリン製剤*の注射を受けたことがある場合は、医師へ申し出てください。

*ガンマグロブリン製剤:感染症の予防や、重症の感染症の治療に使用される血液製剤。



麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を

受けた後に注意すること

- ワクチン接種後30分間はお子様の様子を観察し、病院にいるなどして医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- ワクチン接種後は、副反応* (発熱や発疹など) の出現に注意しましょう。
- 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすらないようにしましょう。
- 接種当日は、接種部位を清潔に保つようにしましょう。
- 接種当日は、激しい運動は避けてください。

*MRワクチンの副反応: ワクチンを接種した後(数日～約2週間まで)に、発熱や発疹などの症状が現れることがありますが、通常は1～2日で治まります。まれに熱性けいれん、ごくまれに脳炎を発症することがあります。もし、高熱やけいれんなどの異常な症状が出現した場合は、速やかに医師に連絡してください。

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を

受けることができない場合

- 37.5℃以上の発熱がある場合。
- 重い急性の病気にかかっている場合。
- 過去に、麻しん、風しんを対象とするワクチン接種を受けてアナフィラキシー*を起こしたことがある場合。
- 医師が予防接種を受けることを不適當と判断した場合。



*アナフィラキシー:全身にわたって症状が出現するアレルギー反応。



〈お子様の麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種スケジュール〉

お子様のMRワクチンの接種スケジュールを計画しましょう。

麻しん、風しんに対する最も効果的な対策は、予防接種です。忘れずにMRワクチンを受けましょう。

	お子様の誕生日			1歳の誕生日			5歳の誕生日					
	年	月	日	年	月	日	年	月	日			
	出生時			12カ月		24カ月	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳
MRワクチン スケジュール				第1期 1回						第2期 1回		
							小学校就学前の1年間(通常、幼稚園・保育園の最年長児がこれにあたります)					
MRワクチン 予約日	第1期:	年	月	日	第2期:	年	月	日				
MRワクチン 接種日	第1期:	年	月	日	第2期:	年	月	日				

※この冊子は、第2期のワクチンの接種が終了するまで大切に保管しましょう。



田辺三菱製薬